# lleostomia ad alta portata

Una stomia che produce più di 2 litri (2000 mL) al giorno è considerata ad alta portata.

#### **Normale Avvertenze** Alto rischio di disidratazione Gli output fisiologici di Una produzione di acqua Una produzione di acqua un'ileostomia per un periodo superiore per un periodo superiore a 24 ore richiede l'intervento dovrebbero avere una a 12 ore dovrebbe essere esaminata ulteriormente di un professionista consistenza simile ad sanitario. e dovrebbero essere un budino presi in considerazioni Contattate il vostro · La sacca per stomia alcuni cambiamenti nella infermiere stomaterapista dovrebbe essere svuotata dieta. da quattro a sei volte al o il vostro medico di famiglia giorno · Se il vostro sistema di · Imparate a riconoscere i raccolta deve essere · È normale che la segni e i sintomi della svuotato più di sei volte al consistenza delle feci disidratazione: giorno, potreste essere a possa variare durante il - Aumento della sete, rischio di disidratazione giorno a seconda del letargia, crampi muscolari, consumo di cibo Aumentare l'assunzione secchezza delle fauci, crampi di sodio mangiando cibi · Cercate di mangiare a addominali, diminuzione della ad elevato contenuto di intervalli regolari evitando di produzione di urina e vertigini sodio come: brodo. saltare i pasti quando si è in piedi. verdure in scatola e • Il momento migliore per il succo di pomodoro cambio del sistema di · Utilizzare una dieta a raccolta è la mattina prima di base di grassi moderati e aver mangiato o bevuto carboidrati essenziali: qualcosa - Amido e legumi: pane, pane Bere circa due litri di liquidi al di mais, pasta, riso. giorno · Ridurre la frutta e le verdure a · Per output che subiscono foglia verde (compresi i variazioni significative nel succhi di frutta) corso della giornata, considerare la possibilità · Suddividere il cibo e le di tenere un diario bevande - consumare liquidi alimentare mezz'ora prima o dopo i pasti · Fate attenzione al colore delle urine - dovrebbero risultare di un giallo

paglierino

### lleostomia ad alta portata

## Monitoraggio output stomia

	ASSUNZION	11	ОИТРИТ				
Data	Ora	Assunzione di liquidi	Data	Ora	Output feci	Conteggio minzioni	Colore Urine

Per domande sui prodotti, esigenze di campionatura o domande cliniche dettagliate sui nostri prodotti negli Stati Uniti, chiamare il numero 1.888.808.7456. In Italia chiamare il numero verde 800.836.088

Si raccomanda un follow-up di routine con il proprio operatore sanitario.

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto/accessorio per stomia, assicurarsi di leggere tutti gli allegati e le etichette dei prodotti

Referenze:

J.E. Carmel, J.C. Colwell, M.T. Goldberg (Eds.), WOCN Society Core Curriculum Ostomy Management (p. 144). Philadelphia: Wolters Kluwer (2014). Medlin, S. (2012). Nutritional and fluid requirements: High-output stomas. British Journal of Nursing, 21(6) Parrish, C. R. (2005). A patient's guide to managing a short bowel. Newark, DE: Growth.

Il logo Hollister e " Healthy Skin: Positive Outcomes" sono marchi registrati da Hollister Incorporated. @ 2020 Hollister Incorporated. 923067 – 1217 US-00222

Hollister Incorporated 2000 Hollister Drive Libertyville, Illinois 60048 1.800.323.4060

#### www.hollister.com

Hollister S.p.A Strada 4 Palazzo A 7 Milanofiori – Assago, Ml 20090 800.836.088

